

Barn (2-17 år) med mycket hög risk för allvarlig pneumokockinfektion

- Nedsatt immunförsvar
- Cochleaimplantat
- Cystisk fibros
- Organtransplantation

Oavsett tidigare vaccination med **PCV10/13/15** och/eller **PPV23**

En dos **PCV20** minst ett år efter ev föregående pneumokockvaccination

- Aspleni eller hypospleni
- Likvorläckage

Tidigare ovaccinerad mot pneumokocker

En dos **PCV20** följt av en dos **PPV23** minst två månader senare

Revaccination med **PPV23** vart femte år

Tidigare vaccinerad med **PCV10/13/15** och/eller **PPV23**?
(barn födda 2009 och senare erbjuds konjugatvaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet)

En dos **PCV20** minst 1 år efter föregående pneumokockvaccin

En dos **PPV23** minst två månader efter **PCV20** förutsatt att det gått minst 5 år sedan ev tidigare **PPV23**

Alla, både de som omfattas av **Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det särskilda vaccinationsprogrammet** om pneumokockvaccination till riskgrupper, erbjuds **kostnadsfri vaccination** i Halland men endast de som omfattas av programmet ska **rapporteras till NVR**. Personer med mycket hög risk omfattas av programmet.



- **PPV23** Pneumovax
- **PCV10** Synflorix
- **PCV13** Prevenar 13
- **PCV15** Vaxneuvance
- **PCV20** Prevenar 20 (tidigare Apexxnar)