

Vuxna (18 år och äldre) med mycket hög risk för allvarlig pneumokockinfektion

- Nedsatt immunförsvar
- Cochleaimplantat
- Cystisk fibros
- Organtransplantation
- Kronisk njursvikt

Tidigare ovaccinerad mot pneumokocker

En dos PCV20

Behovet av påfyllnadsdos efter vaccination med konjugatvaccin är ännu inte säkerställt

Tidigare vaccinerad med PCV10-15 och/eller PPV23

En dos PCV20 minst ett år efter föregående pneumokockvaccin

- Aspleni eller hypospleni

Tidigare ovaccinerad mot pneumokocker

En dos PCV21 följt av en dos PPV23 två månader senare

Revaccination med PPV23 vart femte år

Tidigare vaccinerad med PCV10-15 och/eller PPV23

En dos PCV21 minst ett år efter föregående pneumokockvaccin

En dos PPV23 minst två månader efter PCV21 förutsatt att det gått minst fem år sedan ev tidigare PPV23

Tidigare vaccinerad med PCV20

En dos PPV23 minst två månader efter PCV20 förutsatt att ingen dos PPV23 givits de senaste fem åren.

- Likvorläckage

Tidigare ovaccinerad mot pneumokocker

En dos PCV20 följt av en dos PPV23 två månader senare

Tidigare vaccinerad med PCV10-15 och/eller PPV23

En dos PCV20 minst ett år efter föregående pneumokockvaccin

En dos PPV23 minst två månader efter PCV20 förutsatt att det gått minst fem år sedan ev tidigare PPV23

Alla, både de som omfattas av **Folkhälsomyndighetens rekommendationer** och **det särskilda vaccinationsprogrammet** om pneumokockvaccination till riskgrupper, erbjuds **kostnadsfri vaccination** i Halland men endast de som omfattas av programmet ska **rapporteras till NVR**. Personer med mycket hög risk omfattas av programmet.

- PPV23 Pneumovax
- PCV10 Synflorix
- PCV13 Prevenar 13
- PCV15 Vaxneuvance
- PCV20 Prevenar 20 (tidigare Apexxnar)
- PCV21 Capvaxine