

Barn (2-17 år) med mycket hög risk för allvarlig pneumokockinfektion

- Nedsatt immunförsvar
- Cochleaimplantat
- Cystisk fibros
- Organtransplantation
- Kronisk njursvikt

Oavsett tidigare vaccination med PCV10/13/15* och/eller PPV23*




En dos PCV20**
minst ett år efter ev föregående
pneumokockvaccination

- Aspleni eller hypospleni

Oavsett tidigare vaccination med PCV10/13/15* och/eller PPV23



En dos PCV20** följt av en dos PPV23
minst två månader efter PCV20 och minst 5 år efter
ev tidigare PPV23



Revaccination med PPV23 vart femte år

- Likvorläckage

Oavsett tidigare vaccination med PCV10/13/15* och/eller PPV23



En dos PCV20** följt av en dos PPV23
minst två månader efter PCV20 och minst 5 år efter
ev tidigare PPV23

- PPV23 Pneumovax
- PCV10 Synflorix
- PCV13 Prevenar 13
- PCV15 Vaxneuvance
- PCV20 Prevenar 20 (tidigare Apexxnar)

*Barn födda 2009 och senare erbjuds konjugatvaccin (PCV10-15) i det allmänna vaccinationsprogrammet

**Behovet av påfyllnadsdos efter vaccination med konjugatvaccin (PCV) är ännu inte säkerställt

Alla, både de som omfattas av **Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det särskilda vaccinationsprogrammet** om pneumokockvaccination till riskgrupper, erbjuds **kostnadsfri vaccination** i Halland men endast de som omfattas av programmet ska **rapporteras till NVR**. Personer med mycket hög risk omfattas av programmet.